

<ព័ត៌មាន អំពីប្រតិកម្មមមិនល្អ បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង> (캄보디아어)

ក្នុងករណីនេះ សូមធ្វើតាមការណែនាំ។

- ក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ ករណី ឈឺ ឬហឹមកន្ទួលដៃចាក់នោះ សូមសួរអ្នកជាក់ស្តែងជាមួយកន្ទួលដៃស្អាតស្អាត។
- ក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ ករណីមានកំដៅ សូមបរិភោគទឹកអោយបានគ្រប់គ្រាន់ និងសម្អាត។
- ក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ ក្នុងករណីមិនស្បែកខ្លួន ដោយសារមានកំដៅ ឬឈឺសាច់ដុំគឺ អាចជួយអ្នក បានឬសិនបីអ្នក បរិភោគថ្នាំបញ្ចុះកំដៅ ឬថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់។
- * មុននឹងធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំង សូមត្រៀមជាមុនថ្នាំបញ្ចុះកំដៅ និងថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដែលមានផ្ទុកសារធាតុ អាសតោមីណូហ្វែន, ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ ឬសិនបីមានការឈឺខ្លួន សូមបរិភោគថ្នាំបញ្ចុះកំដៅ និងថ្នាំបំបាត់ ការឈឺចាប់។

ក្នុងករណីនេះ សូមទៅទទួល ព្យាបាលពី វេជ្ជបណ្ឌិត។

- ក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ ករណីមានហឺម, ឈឺ, ទ្រង់ក្អកហឺម ដាក់កន្ទួលដៃចាក់ មិនអាចប្រសើរឡើង លើសពី៤៨ម៉ោង
- ក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ ករណីមានលទ្ធភាពឡើងនូវការរលាក ដូចជាពិបាកដកដង្ហើម, ឈឺទ្រង់, ឈឺពោះជាប់រហូត, និង ហឺមដង ក្នុងរយៈពេល៤សប្តាហ៍
- ក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ ឬសិនបីកើតឡើងនូវការឈឺក្បាលខ្លាំងជាប់រហូត ឬលើសពី២ថ្ងៃ, ករណីថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់មិនមានឬសិទ្ធិធាតាឬ មិនអាចសម្រួលបាន ឬក៏មានករណីស្ទុះរាំងភ្នែក
- ក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ ករណីមានលទ្ធភាពឡើងនូវការរលាកស្រស់កំលាំងភ្នែក ឬខុសឬលក្ខណៈធម្មតា
- ក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ ករណីមានស្ថានភាព ឬចេញឈាម ដាក់កន្ទួលដៃ ដដែលមិនមែនចាក់វ៉ាក់សាំង

ក្នុងករណីនេះ សូមរាយការណ៍ទៅលេខ ១១៩ ឬទៅមន្ទីរពេទ្យ បន្ទាប់សង្កេតរកបន្ទាន់។

- ក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ ករណីពិបាកក្នុងការដកដង្ហើម ឬរលាកខ្លាំង
- ក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ ករណីមានលទ្ធភាពឡើងនូវ ការហឺមបបួរមាត់, មុខ ឬការរលាក ចេញកន្ទួលខ្លាំងពេញខ្លួន
- ក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ ករណី សន្លប់ ឬដួល ភ្នែក